



MITTSU

Informatiebrochure Verwijderen / Correctie Filler(s)

*“Ik heb harde zwellingen waar mijn fillers zijn gespoten, ze lijken wel verplaatst”
“Ik ben niet tevreden over het resultaat van mijn permanente filler en ik wil de filler
graag laten verwijderen”.
“Echogeleide drainage en/of ILT heeft niet geholpen”.*

Versie 02-2021 , Copyright 2019, Auteurs: dr. Frank Niessen en Belinda Roerig

MITTSU INSTITUTE | Achillesstraat 85 | 1076 PX Amsterdam | T +31 (0)20 341 20 01 | E info@mitsu-institute.com
KvK 70519269 | AGB 90064128



Inhoud

Filler verwijderen..... 3
Vorbereiding..... 4
De operatie..... 5
Na de operatie..... 5
Het resultaat..... 6
Complicaties..... 6
Heb je nog vragen?..... 6



Filler verwijderen

Wat zijn fillers? Fillers zijn ruwweg in onderstaande groepen te verdelen:

- **Collageenstimulerende producten** zoals polymelkzuur oftewel Sculptra. Dit product zet het weefsel aan tot vorming van bindweefsel en collageen en wordt meestal toegepast op grotere regio's van het gelaat voor volume toename.
- **Afbreekbare injectables** vooral voor rimpelopvulling en jukbeen/wang volume zoals hyaluronzuur (Restylane, Juvederm, Stylage, Teosyal, Belotero, e.a.), hyaluronzuur en hydroxyapatiet (Radiesse) en collageeninjecties. Deze producten zijn voor het lichaam herkenbaar en worden langzaam door enzymen volledig afgebroken.
- **Permanente injectables** zoals Bio-Alcamid, Aquamid, Artecoll, Dermalive, Siliconenolie en Dermalpolymeren zijn niet lichaamsherkenbaar en kunnen niet worden afgebroken. Er wordt een littekenkapsel omheen gevormd. Daarnaast is er nog een restgroep zoals b.v. Hyacorp en Beutical wat als hyaluronzuur werd aangeboden maar toch andere componenten bleek te bevatten.

De laatste groep permanente fillers kan voor problemen zorgen. De beroepsverenigingen voor cosmetisch artsen en plastisch chirurgen, en ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben het advies gegeven deze middelen niet meer te gebruiken. Echter deze permanente fillers zijn op grote schaal toegepast en dus hebben veel mensen deze producten ingespoten gekregen en lopen ze er nog mee rond. In steeds meer gevallen geven deze injectables langere tijd na het inspuiten complicaties.

Indien je een permanente filler hebt kan het dus zijn dat het resultaat minder mooi is geworden, of dat er complicaties zijn opgetreden zoals toenemende zwelling, ontstekingen, abcessen, inkapseling, granulomen, met als gevolg harde verdikkingen, verlittekening, verplaatsing van de filler naar andere plaatsen in het gelaat en soms zelfs wonden van de huid.

In de praktijk zien we vooral onderhuidse verdikkingen en verplaatsingen van de filler ontstaan. Verplaatsing (migratie) is het gevolg van de zwaartekracht, het samentrekken van de spieren, de kapselvorming én/of van het veranderen van vorm en structuur van het gezicht door veroudering.

Het is mogelijk om filler te laten verwijderen door echografische drainage techniek en met een laser behandeling. Mocht deze behandeling niet baten of niet geïndiceerd zijn, dan kan de filler chirurgisch verwijderd worden. De specialist maakt dan een incisie op de besproken locatie en verwijdert dan eventueel littekenweefsel en filler. Soms is het niet mogelijk om al het filler materiaal te verwijderen.



Als bescherming voor eventuele infecties wordt er een korte antibiotica kuur gegeven en bij mensen met frequente koortslip aanvallen ook een profylaxe tegen herpes uitbraken. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van steroïden of immuunonderdrukkende medicatie. Soms zijn meerdere behandelingen noodzakelijk.

Het kan zijn dat het verwijderen van de filler met eventueel littekenweefsel een holte doet ontstaan in de huid waardoor de huid ruimer wordt en verslapt. Dit is mogelijk op te lossen door middel van een facelift of het opvullen middels lichaamseigen vet voor behoud van volume (lipofilling). Meer informatie over deze behandelingen zijn te vinden in de informatiebrochures Facelift en Lipofilling.

Mocht er sprake zijn van een abces ontstaan door complicatie van permanente fillers dan wordt chirurgisch in eerste instantie een open drainage toegepast en wordt de wond enkele dagen gespoeld. Indien dit niet afdoende is en het product vast zit in het weefsel en pus blijft produceren, wordt dit chirurgisch verwijderd. Hierbij moet ook omringend weefsel mee genomen worden, met soms volumeverlies en littekens als gevolg.

De behandeling van complicaties van permanente fillers is in de praktijk moeizaam: het is niet altijd mogelijk om het geïnjecteerde materiaal volledig te verwijderen, de klachten kunnen persisteren of recidiveren. Ook kan er bij mensen die daar gevoelig voor zijn extra littekenweefsel gevormd worden.

Vorbereiding

Voordat je geopereerd wordt, moeten eerdere operaties en eventuele allergieën bekend zijn bij de plastisch chirurg. Als je medicijnen gebruikt, geeft de plastisch chirurg aan met welke medicijnen je voor de operatie moet stoppen. Dit geldt met name voor medicijnen die de bloedstolling remmen, zoals Ascal, Sintrom en Marcoumar. Als pijnstiller kun je paracetamol gebruiken.

Als je besluit om een chirurgische correctie uit te laten voeren, moet je je realiseren dat, afhankelijk van de uitbreid van de ingreep, het operatiegebied er gedurende enkele weken niet representatief uitziet. Indien gewenst is het gebruik van een camouflerend product toegestaan.

Wij adviseren dan gebruik te maken van een camouflerend product van het merk Lycogel welke direct de dag na de operatie gebruikt mag worden. Dit product is te verkrijgen bij de huidtherapeut. Voor verkoop informatie voor een verkooppunt bij jou in de buurt- kun je de volgende website bezoeken: <http://www.lycogel.nl/kopen-lycogel/>

Let op: Andere merken camouflerende producten mogen natuurlijk ook gebruikt worden- maar mogen enkel gebruikt worden zodra de wond goed geheeld is, vanaf een week na de ingreep. Voor verder advies over de juiste verzorging van het littekengebied, verwijzen we je naar ons Prepare Protect Regenerate plan, te vinden in de behandelovereenkomst die je ontvangt na het consult.



De operatie

Uw plastisch chirurg tekent het te behandelen gebied af en vervolgt de operatie volgens het besproken operatieplan. De operatie vindt plaats onder lokale verdoving. Hiervoor krijg je injecties met een verdovingsvloeistof in het te behandelen gebied. Zodra de verdoving is ingewerkt, voel je uiteraard niets van de ingreep. De eventuele wond wordt daarna zorgvuldig gehecht met niet oplosbare hechtingen en indien nodig verbonden met steristrips. Wanneer het verwijderen van de filler wordt gecombineerd met een facelift, dan vindt deze in narcose plaats.

Na de operatie

- Kun je direct naar huis. Het is prettig als je er voor zorgt dat iemand je ophaalt na de ingreep. Hoewel het meestal om een kleine correctie gaat en je in de meeste gevallen prima in staat bent zelf met de auto te rijden- mag je niet zelfstandig rijdend met de auto naar huis na een chirurgische ingreep. Dit heeft een verzekerings reden. Je kunt naar huis middels het openbaar vervoer, opgehaald worden door een begeleider of met de taxi. Zelf met de auto naar huis is zodoende op eigen verantwoordelijkheid.
- Kun je na de operatie mogelijk wat pijn en ongemak ervaren. Je kunt tegen de pijn Paracetamol gebruiken.
- Kun je eventuele zwelling verminderen door het gebruik van de Arnica en gedurende twee dagen maximaal driemaal daags tien minuten icepacks op de wond of wondjes te leggen. Hieronder leg je ter bescherming van de weefsels een gaas of doekje.
- De hechtingen van de correctie zijn meestal niet oplosbaar en moeten een week na de ingreep worden verwijderd. Je kunt gewoon douchen en de wondjes van de correctie mogen nat worden.
- Je kunt na de operatie het litteken insmeren met de door de plastisch chirurg geadviseerde littekencrème, zie daarvoor het Prepare Protect Regenerate plan te vinden in de behandelovereenkomst. Ultraviolette stralen zijn niet goed voor het litteken, het litteken kan daardoor onnodig lang rood blijven. Daarom is dagelijks gebruik van sunblock, gedurende de eerste drie maanden na de ingreep te adviseren.
- Voor de genezing is het van belang om spanning op de wondranden zoveel mogelijk te vermijden. Bepaalde bewegingen zoals bukken, tillen, gapen en lachen dien je uiterst voorzichtig mee te zijn.
- Sporten wordt twee tot vier weken na de ingreep afgeraden. De plastisch chirurg zal je hierin adviseren.



- Heb je net voor de operatie aanvangt, een mail ontvangen met de afspraak voor de wondcontrole.
- Eventuele hechtingen en verbandmateriaal worden tijdens de wondcontrole afspraak verwijderd. Na de wondcontrole wordt er indien nodig een vervolgsafpraak gemaakt met de plastisch chirurg.
- Als zich onverwachte problemen voordoen, bijvoorbeeld wanneer er een ontsteking ontstaat, indien je het idee heeft dat het litteken niet fraai geneest of anders zoals omschreven bij mogelijke complicaties onderstaand, neem dan contact op met ons centrum.

Het resultaat

Het operatiegebied zal na de operatie enige tijd rood, gezwollen en gevoelig zijn. Over het algemeen trekt de zwelling in de loop van twee weken langzamerhand weg, maar is pas na ongeveer zes weken helemaal verdwenen. Het litteken kan nog lang gevoelig blijven. Volledige symmetrie wordt nagestreefd, maar kan nooit voor 100% gegarandeerd worden. De behandeling van complicaties van permanente fillers is in de praktijk moeizaam: het is niet altijd mogelijk om het geïnjecteerde materiaal volledig te verwijderen, de klachten kunnen persisteren of recidiveren. Mogelijk zijn meerdere operaties nodig. Het kan zijn dat de filler niet in zijn volledigheid verwijderd kan worden en in de toekomst nog voor problemen kan zorgen. Als je het idee hebt opnieuw last te krijgen van onverklaarbare zwellingen, neem dan direct contact met ons of je cosmetisch arts op.

Complicaties

Bij elke operatie bestaat een kans op de volgende complicaties:

- infectie (pijn, zwelling, roodheid en pus uit het wondgebied).
- nabloeding
- bloeduitstorting
- zwelling
- slechte wondgenezing.
- overmatige littekenvorming
- overgevoeligheid of minder gevoeligheid van het geopereerde gebied
- asymmetrie

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met ons centrum. Tel: 020 341 20 01 of mail naar: info@mitsu-institute.com

We informeren je graag.

