



MITTSU

Informatiebrochure Wenkbrauwcorrectie

“Mensen denken dat ik boos ben..”“

“Ik ervaar zo’n zwaar gevoel op mijn ogen..”

“En ’s avonds is het nog erger..”

“Het zakken van mijn wenkbrauwen doet mij er ouder en vermoeid uitzien”

“ik wil de stand van mijn wenkbrauwen verfraaien”

Versie 02-2022 , Copyright 2019, Auteurs: dr. Frank Niessen en Belinda Roerig

MITTSU INSTITUTE | Achillesstraat 85 | 1076 PX Amsterdam | T +31 (0)20 341 20 01 | E info@mittsu-institute.com
KvK 70519269 | AGB 90064128

Inhoud

Benieuwd naar welk resultaat je ongeveer kunt verwachten?.....	3
Vorbereiding.....	3
De operatie.....	4
Wenkbrauwsuspensie.....	4
Wenkbrauwlift.....	4
Na de operatie.....	5
Het resultaat.....	6
Complicaties.....	6
Heb je vragen?.....	7



Waarom een wenkbrauwcorrectie?

Heb je last een zwaar gevoel op de oogleden, gecombineerd met een vermoeid of nors uiterlijk door verzakte wenkbrauwen? Dit zijn veelgehoorde klachten van mensen die een wenkbrauwcorrectie overwegen. Als gevolg van volumeverlies door ouder worden en door genetische aanleg kan de huid van de wenkbrauwen slapper worden en op het bovenste ooglid drukken. Dit kan een vermoeid of nors uiterlijk geven, wat je als storend kunt ervaren omdat je je helemaal niet zo voelt.

Het kan ook zijn dat je de positie van je wenkbrauwen graag wilt verfraaien voor een esthetisch mooiere uitdrukking van het gelaat.

Voor het corrigeren van gezakte wenkbrauwen zijn er verschillende methoden: een wenkbrauw suspensie en een wenkbrauwlift.

In sommige gevallen is een endoscopische voorhoofdslift of traditionele voorhoofdslift nodig. Een correctie aan de wenkbrauwen wordt vaak gecombineerd met een ooglidcorrectie. Meer informatie over een ooglidcorrectie of voorhoofd correctie, vind je in de beschikbare folders over deze ingrepen.

Benieuwd naar welk resultaat je ongeveer kunt verwachten?

Klik op de volgende link: [Voor- en na foto's](#) om een beeld te krijgen van de mogelijke resultaten.

Vorbereiding

Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat iemand je ophaalt na de ingreep. Je mag niet zonder begeleiding naar huis. Voordat je geopereerd wordt, moeten eerdere operaties en eventuele allergieën bekend zijn bij de plastisch chirurg. Als je medicijnen gebruikt, geeft de plastisch chirurg aan met welke medicijnen je voor de operatie moet stoppen. Dit geldt met name voor medicijnen die de bloedstolling remmen, zoals Aspirine, Sintrom en Marcoumar. Als pijnstillers kun je paracetamol gebruiken. Zorg je dat je van tevoren voldoende Paracetamol in huis hebt.

Als je besluit om een wenkbrauwcorrectie uit te laten voeren, is het belangrijk je te realiseren dat je er gedurende enige tijd niet representatief uitziet. Voor een correctie van de wenkbrauwen is dit meestal rond de 7 tot 10 dagen.

Ter voorbereiding van de ingreep- met als doel een meest optimale genezing- adviseren wij je aan ons Prepare-Protect-Regenerate (P2R) plan te houden. Deze is te vinden in de behandelovereenkomst.

Bovendien adviseren we je coolpacks aan te schaffen (te koop bij de apotheek) of diepvrieserwtjes (te koop bij de supermarkt) om na de operatie te kunnen koelen. Diepvrieserwten in een boterhamzakje leg je op het voorhoofd waarop eerst een beschermende zakdoek of gaas is gelegd.

Drukkleding zoals aangegeven in het P2R plan is voor deze behandeling niet nodig.



De operatie

Wenkbrauwsuspensie

In het geval van hangende bovenoogleden zit de basis van het probleem vaak ook in de wenkbrauwen die gaan zakken, met name aan de buitenkanten van de wenkbrauwen. Daarnaast kan er ook een teveel aan uitgerekte bovenooglid huid bestaan. Dus bij een afdoende ingreep moet je zowel iets aan de bovenoogleden doen als aan de uitzakkende wenkbrauwen.

Dit kan door een ooglidcorrectie in combinatie met een wenkbrauwsuspensie uit te voeren. Bij een wenkbrauwsuspensie wordt middels de snede die gemaakt wordt in het bovenooglid, de buitenste hoek van de wenkbrauw losgemaakt en hoger vastgezet op het wenkbrauwbot met twee hechtingen. Meer informatie over de bovenooglidcorrectie behandeling, vind je in de brochure oogleden.

Een wenkbrauwsuspensie is een redelijk eenvoudige ingreep en vindt plaats onder lokale verdoving. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten (in combinatie met de ooglidcorrectie) en vindt plaats in dagbehandeling.

Wenkbrauwlift

De wenkbrauwlift kan gedaan worden via een operatie vanuit kleine incisies in de haargrens of middels huidexcisie vlak boven de wenkbrauw. Bij deze laatste ingreep maakt de plastisch chirurg kleine incisies boven de wenkbrauwen, in de huidplooiën. Op deze wijze snijdt de plastisch chirurg het huidoverschot weg en worden de wenkbrauwen opgetrokken en vastgezet met oplosbare hechtingen.

Deze ingreep is geschikt voor mensen die al wat diepere huidplooiën boven de wenkbrauwen hebben. In deze huidplooiën komt namelijk het litteken. Bij mensen die deze diepe huidplooiën niet hebben, zal het litteken te veel opvallen en is deze ingreep dus niet geschikt. Hiervoor is een endoscopische voorhoofdslift beter geschikt, of een wenkbrauwlift vanuit kleine incisies in de haargrens.

Wenkbrauwlift via de haargrens

Bij een wenkbrauwlift via de haargrens wordt de diepe stevige onderhuidse voorhoofds laag, ook wel de galea genoemd, ingesneden en wordt deze over enkele centimeters richting wenkbrauw losgemaakt. Daarna wordt de galea opnieuw doorgesneden en wordt het onderhuidse weefsel tot op de wenkbrauw losgemaakt. Vervolgens worden in de haargrens de stevige galea lagen aan elkaar vastgehecht waarbij de voorhoofdshuid naar achteren wordt getrokken. Hiermee bereik je aan de buitenzijde van de wenkbrauwen een liftend effect. Het teveel aan huid wordt in de haargrens verwijderd. De huid wordt stevig vastgehecht met oplosbare draden aan de onderlaag. De hechtingen in het voorhoofd worden na 3 dagen verwijderd, die in de haargrens na een week.



Cat eye lift

Afhankelijk van de wens van de patiënt kan de wenkbrauw volgens dezelfde techniek als de wenkbrauwlift via de haargrens worden toegepast, met als verschil dat de buitenste zijden van de wenkbrauwen nog hoger worden gezet. Hierbij worden de onderoogleden ook enigszins gelift. Dit noemen we de cat eye lift. Daarbij wordt vanuit een incisie net achter de haargrens de huid losgemaakt van de voorhoofdspieren tot en met de wenkbrauw en de buitenzijde van de oogkas. De huid wordt dan naar achteren getrokken en met enkele hechtingen weer vastgezet op de spieren. Daarmee wordt een liftend effect verkregen.

Het teveel aan huid wordt in de haargrens verwijderd. De huid wordt stevig vastgehecht met oplosbare draden aan de onderlaag. De hechtingen in het voorhoofd worden na 3 dagen verwijderd, die in de haargrens na een week.

Een wenkbrauwlift wordt vaak gecombineerd met een correctie van de oogleden. Voor meer informatie over de ooglidcorrectie, kun je de informatiebrochure oogleden raadplegen.

Een wenkbrauwlift duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats onder plaatselijke verdoving in dagbehandeling.

Na de operatie

- Lig je enige tijd op een stoel met een icepack op de ogen/wenkbrauwen. Daarna kun je naar huis.
- Is het belangrijk dat iemand je ophaalt en begeleidt, omdat de verdoving het zicht enigszins kan vertroebelen.
- Mag je het gezicht en de haren na de operatie wassen en ook douchen, de pleisters blijven meestal goed zitten en drogen gewoon op.
- Kun je na de operatie pijn en ongemak ervaren, zo ook hoofdpijnklachten. Je kunt voor de pijn Paracetamol gebruiken.
- Kun je de zwelling aan de wenkbrauwen verminderen door het gebruik van de Arnica en maximaal drie maal daags tien minuten coolpacks op de ogen/wenkbrauwen te leggen. Ook raden wij je aan om niet te plat te liggen, maar met het hoofd hoog op meerdere kussens te slapen. Lichamelijke inspanning en sport moet je gedurende de eerste drie weken vermijden. Hetzelfde geldt voor zware dingen tillen en bukken.
- Mag je gedurende twee weken na de operatie geen lenzen, crème en oog make-up dragen.



- Is blootstelling aan ultraviolette stralen niet goed voor de littekens, ze kunnen daardoor onnodig lang rood blijven. Het beste kun je de eerste maanden na de behandeling de littekens bedekt houden, je kunt een zonnebril dragen en vanaf twee weken na de operatie de huid insmeren met een sunblock.
- Voor de operatie ontvang je een mail met een afspraak voor de wondcontrole. Eventuele hechtingen en verbandmateriaal worden tijdens de wondcontrole afspraak verwijderd. Na de wondcontrole wordt er indien nodig een vervolgspraak gemaakt met de plastisch chirurg.
- Als zich onverwachte problemen voordoen, bijvoorbeeld wanneer er een ontsteking ontstaat, indien je het idee hebt dat het litteken niet fraai geneest, of anders zoals omschreven bij mogelijke complicaties onderstaand, neem je contact op met ons centrum.

Voor meer informatie over een ooglidcorrectie operatie, verwijzen wij je naar de informatiefolder ooglidcorrectie. Voor meer informatie over een correctie voorhoofd, verwijzen wij je naar de informatiefolder correctie voorhoofd.

Het resultaat

Na de ingreep is het resultaat al enigszins zichtbaar. Zodra de zwelling volledig verdwenen is, kun je het resultaat goed beoordelen. De zwellingen verdwijnen na ongeveer twee tot zes weken. De wenkbrauwen kunnen wel nog enige tijd gevoelig blijven. Zodra de zwelling volledig verdwenen is, kun je het resultaat goed beoordelen.

Volledige symmetrie wordt uiteraard nagestreefd, maar kan nooit voor 100% gegarandeerd worden.

Het effect van een wenkbrauwcorrectie is van lange duur, maar uiteraard is de veroudering van de huid en de verzakking van de weefsels van het gelaat niet te stoppen. Na een wenkbrauwcorrectie houd je een voorsprong op het verouderingsproces (ongeveer tien jaar).

Complicaties

Bij elke operatie bestaat een kans op de volgende complicaties:

- Infectie (pijn, zwelling, roodheid en pus uit het wondgebied).
- Nabloeding
- Boeduitstorting
- Zwelling
- Slechte wondgenezing.
- Overmatige littekenvorming
- Overgevoeligheid of minder gevoeligheid van het geopereerde gebied
- Asymmetrie



MITTSU INSTITUTE Informatiebrochure Wenkbrauwcorrectie

Heb je vragen?

Neem dan contact op met ons centrum. Tel: 020 341 20 01 of mail naar: info@mitsu-institute.com

We informeren je graag.

